

Réanimation # 4

Numéro infectieux

Autoévaluation–QCM

QCM 1 Parmi les virus suivants, quels sont les deux virus les plus fréquemment responsables de myocardites aiguës dans les pays occidentaux :

- A. Papovavirus
- B. Cocksackievirus
- C. Adenovirus
- D. Hantavirus
- E. Flavivirus

QCM 2 Parmi les signes suivants, quels sont les trois signes qui font craindre une forme fulminante de myocardite aiguë :

- A. Insuffisance cardiaque rapidement progressive
- B. Syndrome grippal récent
- C. Cœur dilaté à l'échographie cardiaque
- D. Hypertrophie myocardique à l'échographie cardiaque
- E. Parois du ventricule de taille normale

QCM 3 À propos des myocardites, quelles sont les deux propositions exactes :

- A. Les formes fulminantes ont un meilleur pronostic que les formes aiguës
- B. Le taux de troponine initial est un facteur pronostic important
- C. Un aspect ECG de courant de lésion sus-épicardique élimine le diagnostic
- D. Un traitement par corticoïdes à fortes doses est indiqué dans les formes fulminantes
- E. Les immunoglobulines polyvalentes améliorent le pronostic des formes fulminantes

QCM 4 Parmi les items suivants, quel est celui qui n'est pas un des facteurs prédisposant à l'infection à *Clostridium difficile* ?

- A. Tous les traitements antibiotiques
- B. La nutrition entérale
- C. La nutrition parentérale
- D. Le diabète
- E. L'hospitalisation

QCM 5 En cas de premier épisode de colite aiguë à *Clostridium difficile*, sans colectasie, quel traitement médical est préconisé ? (deux réponses exactes)

- A. Vancomycine intraveineux
- B. Métronidazole per os
- C. Vancomycine per os
- D. Métronidazole intraveineux
- E. Vancomycine per os + métronidazole intraveineux

QCM 6 Quelles sont les réponses justes concernant l'entretien des fibroscopes bronchiques par technique manuelle ?

- A. Réaliser deux nettoyages
- B. Nettoyer pendant une durée minimale de 15 minutes
- C. Désinfecter avec un produit désinfectant du groupe II (exemple acide peracétique)
- D. Rincer à l'eau stérile ou bactériologiquement maîtrisée
- E. Bien sécher l'endoscope avant stockage

QCM 7 Quels sont les trois agents infectieux qui doivent être détruits lors d'une désinfection de type intermédiaire ?

- A. Spores
- B. Bactéries

- C. Virus
- D. Prion
- E. Champignons

QCM 8 Parmi les propositions suivantes concernant le sepsis, quelles sont les deux propositions exactes ?

- A. La synthèse de l'aldostérone est sous la dépendance de l'ACTH et non de la rénine
- B. L'insulinorésistance est uniquement liée à l'augmentation de cortisol
- C. La conversion de cortisol en cortisone est un mécanisme de résistance tissulaire au cortisol
- D. La prévalence de l'insuffisance surrénale est de 5 %
- E. Le déficit en vasopressine est précoce et intense

QCM 9 Parmi les propositions suivantes concernant le sepsis, quelle est la proposition exacte :

- A. Le contrôle strict de la glycémie diminue la mortalité
- B. La substitution de la fonction minéralocorticoïde est strictement inutile

- C. L'hormone de croissance à fortes doses augmente la mortalité
- D. La terlipressine doit être administrée quelle que soit la gravité du choc
- E. Il n'y a pas de rationnel à la substitution en hormones thyroïdiennes

QCM 10 Parmi les antibiotiques suivants, lesquels sont à bactéricidie temps-dépendante ? (trois réponses exactes)

- A. Aminosides
- B. Glycopeptides
- C. Céphalosporines
- D. Pénicillines
- E. Fluoroquinolones

Réponses

1. B C - 2. A B D - 3. A B - 4. C - 5. B C -
6. A B C D E - 7. B C E - 8. A C - 9. C - 10. B C D