

Numéro inclusion participant:



Stand de l'étude situé en face de l'escalator montant.

En cas d'affluence, vous pouvez vous inscrire sur les 3 journées du congrès.

Contact pour renvoyer les résultats :

Fax : 01.83.71.90.68

Email : [etudecongres@srlf.org](mailto:etudecongres@srlf.org)

# Etude COVID-FREE SRLF

Nom	Prénom	Email

## **CRITERES D'INCLUSION**

Tous les critères d'inclusion suivants doivent être présents :

- Personnel soignant
- Absence de symptômes ou de contacts avec une/des personnes présentant un COVID depuis 2 semaines (Définition cas contact : En l'absence de mesure barrière (notamment absence de masque), personnes : 1) ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 2) Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée. En revanche, des personnes croisées dans l'espace public de manière fugace, même en l'absence de port de masque, ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque ; 3) Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins ; 4) Ayant partagé un espace confiné pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24h avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement ;

## **CRITERES DE NON-INCLUSION**

Aucun des critères de non inclusion suivants ne doit être présent :

- Personnel exposant,
- Personnel appartenant ou rattaché à la société louant les locaux de l'évènement (VIParis),
- Opposition à la participation à l'étude,
- Personnes non affiliées à la sécurité sociale,
- Personne sous tutelle ou curatelle.

# Données à l'inclusion

Année de naissance : .....

Sexe :  Femme  Homme

Date de l'inclusion dans l'étude : ...../...../.....

Taille : ..... cm

Poids à l'inclusion : ..... Kg

Ville d'origine (lieu de travail) : .....

Profession :

Médecin  IDE  AS  Kinésithérapeute  Psychologue  Autre (préciser : .....

Statut vaccinal :  2 doses  1 doses  0 doses

(nombre de dose de vaccin anti-SARS-CoV-2 reçu, quel que soit le type de vaccin)

Type de vaccin :  Pfizer  Moderna  Astra Zeneca  Johnson  Schéma hétérologue (AZ + ARNm)

Si vous avez été vacciné, à quelle date ? 1<sup>ère</sup> dose ...../...../..... 2<sup>ème</sup> dose ...../...../.....

Avez-vous déjà eu la COVID ? :  Oui  Non

Si oui, à quelle date ? ...../...../.....

Si oui, l'infection à SARS-CoV-2 a-t-elle été prouvée par test PCR et/ou sérologique ?  Oui  Non

Présentez-vous au moins l'un des critères de vulnérabilité ci-dessous ?  Oui  Non

Liste de critères Personnes vulnérables – Journal officiel 11/01/2021

- Être âgé de 65 ans et plus ;
- Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m<sup>2</sup>) ;
- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Être au troisième trimestre de la grossesse ;
- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm<sup>3</sup> ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
- Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiparésie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.