

Hygiène et isolement :

Enquête de la Commission du Congrès Infirmier de la SRLF

Justification de l'enquête

- Apparition de pandémies , de bactéries hautement résistantes
- Evaluation des pratiques//Recommandation de la SFHH
- Etat des lieux en réanimation aujourd'hui

Objectifs

Connaître les pratiques et le ressenti des soignants par rapport aux mesures d'hygiène


- compréhension et réalisation
- modalités de mise en œuvre et d'application
- Impact sur les soins

Méthode

- Questionnaire créé par la CCI de la SRLF
- Validation par le CA
- La mise en ligne via le site web
- Fin de l'enquête le 30/09/2012
- Analyse des résultats

Résultats

459 répondants travaillant en :




Service Adulte
96%

Pédiatrique 4%

Caractéristiques des répondants

Qui sont les répondants ?




Ratio
IDE/Patient :
90% au
décret

Ratio
AS/Patient :
71% au décret


Qui isoler ?

A L'admission




Comment isoler ?

Les patients porteurs de BMR




Les patients porteurs de BHR




Signalétique

Êtes-vous clairement informé du type d'isolement mis en place pour vos patients ?



Existe-il un signalement ou un affichage à l'entrée de la chambre permettant aux intervenant d'être informés de celui-ci et de son type?



- Jamais
- Parfois
- Souvent
- Toujours

Environnement

- Flacons de FHA accessibles facilement 99%
- Un point d'eau dans chaque chambre 99%
- Pièce dédié à la désinfection du matériel 90%
- Un bionettoyage quotidien de la chambre 88%
- Fréquence de bionettoyage plus élevé quand BMR 16%
- Pulvérisation terminale 26%
- Procédure spécifique d'évacuation des déchets quand BMR 50%

Quand effectué une FHA

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Avant de toucher le patient | 94,6% |
| <input type="checkbox"/> Entre deux soins | 70% |
| <input type="checkbox"/> Après avoir touché le patient | 98% |
| <input type="checkbox"/> Avant de toucher l'environnement | 68% |
| <input type="checkbox"/> Avant de mettre des gants | 70% |
| <input type="checkbox"/> Après avoir retiré les gants | 83% |




Respect de la méthode de friction

- 27% toujours

- 62% souvent

Port de bijoux :12%

Réticences à la réalisation d'une FHA : 30%




- Des lésions cutanées préexistantes à l'utilisation de SHA
- Des lésions cutanées induites par le SHA
- Aux applications trop fréquentes
- Le caractère collant du soluté
- Au manque de temps
- Au caractère parfois jugé inutile de l'application
- A sa moindre efficacité par rapport au savon antiseptique

Protections pour les soignants : Le port de gant


- avant de toucher un patient : 21%
- avant un prélèvement sanguin : 69%
- quand patient porteur de BMR

- **Systématique à l'entrée dans la chambre**
- **Limité au contact avec le patient**
- **Limité au risque de souillure avec liquide biologique**



Protection vestimentaire pour les soignants


Utilisez-vous une protection de votre tenue ?



■ **Seulement lors des soins mouillants, souillants ou susceptibles d'occasionner une souillure par des liquides biologiques**

■ Lors de tout contact avec le patient

Si le patient est BMR, le port de protection vestimentaire est-il ?



■ **Systématique à l'entrée dans la chambre**


■ **Limité au contact avec le patient**

■ **Limité au risque de souillure avec liquide biologique**


Protections lors des aspirations trachéales

Lors d'une aspiration trachéale ou d'une déconnection du circuit du ventilateur, portez-vous :

Une protection oculaire
(lunettes ou masque à visière)



Une protection respiratoire
(masque ou masque à visière)



- Jamais
- Parfois
- Souvent
- Toujours

Les familles

Incitation au FHA

Avant l'entrée dans la chambre	94%
--------------------------------	-----

A la sortie de la chambre	88%
---------------------------	-----

Pour les proches d'un patient porteur de BMR, est-il obligatoire de porter :

oui

Une protection vestimentaire	30%
------------------------------	-----

Des gants	47%
-----------	-----

Un masque	21%
-----------	-----

Les formations et informations


- Au moins une/an 50%
- Connaissance consommation FHA 50%
- Connaissance taux infections nosocomiales 60%
- Présence de l'équipe opérationnelle d'hygiène 60%

Ressenti

- Qui est protégé ? les deux pour 70%
- Bonne compréhension des modes de transmissions 58%
- 1 personnel sur 5 inquiétudes pour sa santé
- Respect de la technique de friction


Ressenti

Selon vous, dans votre service, les règles d'hygiène et en particulier l'hygiène des mains sont-elles respectées par :



Quels outils ?

Quels sont selon vous les moyens les plus efficaces pour vous inciter au respect des règles d'hygiène et notamment de la friction hydroalcoolique?



Conclusion

- ❑ Respect des principales règles d'hygiène
- ❑ Discordances entre les recommandations et les pratiques en matière d'isolement

